

Таблица 2. Демографические и клинические характеристики пациентов с острым ишемическим инсультом и дислипидемией со стратификацией по получению терапии ртАП и полу

	Получали ртАП			Не получали ртАП		
	Мужчин ы	Женщин ы	Значен ие р	Мужчин ы	Женщин ы	Значен ие р
Количество пациентов	182	143		203	241	
Возрастная группа: кол-во (%)						
менее 50 лет	13 (7,1)	15 (10,5)	0,002*	14 (6,9)	11 (4,6)	0,001*
от 50 до 59 лет	46 (25,3)	16 (11,2)		23 (11,3)	29 (12,0)	
от 60 до 69 лет	45 (24,7)	35 (24,5)		62 (30,5)	37 (15,4)	
от 70 до 79 лет	45 (24,7)	30 (21,0)		54 (12,6)	75 (31,1)	
старше 80 лет	33 (18,1)	47 (32,9)		50 (24,6)	89 (36,9)	
Среднее ± СО	66,5±11,7	70,4±14,9	0,011*	69,9±12,7	73,6±12,7	0,002*
Раса: количество (%)						
Европеоидная	151 (83,0)	115 (80,4)	0,835	167 (82,3)	194 (80,5)	0,667
Афроамериканска я	29 (15,9)	26 (18,2)		32 (15,8)	44 (18,3)	
Другое	2 (1,1)	2 (1,4)		4 (2,0)	3 (1,2)	
Медицинский анамнез: количество (%)						
Гипертензия	167 (91,8)	131 (91,6)	0,961	176 (86,7)	214 (88,8)	0,501
Ишемическая болезнь сердца	84 (46,2)	40 (28,0)	0,001*	96 (47,3)	87 (36,1)	0,017*
Дислипидемия	74 (53,2)	63 (54,3)	0,864	41 (51,9)	26 (45,6)	0,469
Фибрилляция / трепетание предсердий	29 (15,9)	27 (18,9)	0,485	53 (26,1)	71 (29,5)	0,433
Инсульт	54 (29,7)	36 (25,2)	0,369	76 (37,4)	90 (37,3)	0,984

	Получали ртАП			Не получали ртАП		
	Мужчины	Женщины	Значение <i>p</i>	Мужчины	Женщины	Значение <i>p</i>
Транзиторная ишемическая атака	31 (17,0)	15 (10,5)	0,093	31 (15,3)	26 (10,8)	0,160
Застойная сердечная недостаточность	18 (9,9)	15 (10,5)	0,859	29 (14,3)	40 (16,6)	0,503
Стеноз сонных артерий	12 (6,6)	2 (1,4)	0,022*	26 (12,8)	18 (7,5)	0,061
Заболевание периферических сосудов	14 (7,7)	12 (8,4)	0,818	19 (9,4)	24 (10,0)	0,832
Курение	60 (33,0)	33 (23,1)	0,050*	45 (22,2)	38 (15,8)	0,085
Диабет	64 (35,2)	48 (33,6)	0,763	76 (37,4)	105 (43,6)	0,190
Применение лекарственных препаратов: количество (%)						
Антиагреганты	129 (70,9)	86 (60,1)	0,042*	133 (65,5)	164 (68,0)	0,572
Антигипертензивные препараты	157 (86,3)	128 (89,5)	0,376	163 (80,3)	203 (84,2)	0,278
Препараты для снижения уровня холестерина	146 (80,2)	106 (74,1)	0,191	154 (75,9)	182 (75,5)	0,933
Препараты для лечения диабета	48 (26,4)	43 (30,1)	0,461	60 (29,6)	80 (33,2)	0,411
Первоначальная группа по шкале инсульта НИЗ: количество (%)						
0–9	119 (65,4)	84 (58,7)	0,616	158 (77,8)	159 (66,0)	0,026*
10–14	24 (13,2)	20 (14,0)		19 (9,4)	27 (11,2)	
15–20	21 (11,5)	20 (14,0)		12 (5,9)	31 (12,9)	
21–25	18 (9,9)	19 (13,3)		14 (6,9)	24 (10,0)	

	Получали ртАП			Не получали ртАП		
	Мужчины	Женщины	Значение <i>p</i>	Мужчины	Женщины	Значение <i>p</i>
Среднее ± СО	9,00±6,6	9,97±6,8	0,197	6,33±6,2	8,24±6,8	0,002*
Риск летального исхода по шкале программы Get With The Guidelines для ишемического инсульта:						
Среднее ± СО	5,35±5,9	5,59±6,1	0,727	4,04±4,9	5,09±5,5	0,046*
Индекс массы тела						
Среднее ± СО	28,6±5,8	29,7±7,6	0,153	28,0±5,7	29,2±8,3	0,080

Непрерывные переменные представлены в виде средних значений ± стандартные отклонения (СО). Сравнения между группами были проведены по Т-критерию Стьюдента. Дискретные переменные представлены в виде чисел (частота, выраженная в процентах). Сравнения между группой, получавшей ртАП, и группой, не получавшей ртАП, были проведены по критерию хи-квадрат Пирсона.