

Таблица 2. Исходные характеристики пациентов с СН по квартилям МКС и полу

	Все (<i>n</i> = 4684)			Женщины (<i>n</i> = 1251)			Мужчины (<i>n</i> = 3443)		
	Женщины (<i>n</i> = 1251)	Мужчины (<i>n</i> = 3433)	<i>P</i> - значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (<i>n</i> = 921)	Уровень МКС квартиль 4 (<i>n</i> = 330)	<i>P</i> - значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (<i>n</i> = 2589)	Уровень МКС квартиль 4 (<i>n</i> = 844)	<i>P</i> - значение
МКС, мг/дл	435,2 ± 143,9	468,9 ± 127,1	< 0,001	367,4 ± 86,1	624,1 ± 96,6	< 0,001	413,3 ± 80,7	639,6 ± 84,3	< 0,001
МКС, мг/дл, %	7,32 ± 2,42	7,88 ± 2,14		6,18 ± 1,45	10,49 ± 1,62		6,95 ± 1,36	10,75 ± 1,42	
Возраст, лет	72,1 ± 12,1	68,6 ± 12,1	< 0,001	70,7 ± 12,3	76,2 ± 10,4	< 0,001	68,1 ± 12,2	70,3 ± 11,6	< 0,001
Индекс массы тела, кг/м ²	25,6 ± 5,6	26,6 ± 4,9	< 0,001	25,4 ± 5,6	26,1 ± 5,4	0,054	26,4 ± 4,9	27,1 ± 5,2	0,001
Курение, %	12,6	16,3	0,002	14,3	7,9	0,002	16,8	15,1	0,247
Медицинский анамнез									
Сахарный диабет, %	18,7	19,9	0,352	16,6	24,6	0,001	18,7	23,7	0,001
Ишемическая болезнь сердца, %	46,0	59,6	< 0,001	44,2	50,8	0,045	59,1	61,1	0,323
Гипертония, %	37,1	30,2	< 0,001	33,5	47,1	< 0,001	28,4	35,6	< 0,001
Хромота/инсульт, %	13,6	15,8	0,071	13,4	14,1	0,777	14,9	18,4	0,016

	Все (n = 4684)			Женщины (n = 1251)			Мужчины (n = 3443)		
	Женщины (n = 1251)	Мужчины (n = 3433)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 921)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 330)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 2589)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 844)	P-значение
PCI/CABG, %	26,1	42,5	< 0,001	25,9	26,7	0,774	42,6	42,0	0,746
Сниженная почечная функция, %	51,3	40,1	< 0,001	39,7	83,6	< 0,001	31,3	67,3	< 0,001
Физические показатели									
Пульс, ударов/мин.	73,5 ± 14,3	72,2 ± 15,2	0,008	73,1 ± 14,5	74,6 ± 13,7	0,105	71,9 ± 14,8	73,1 ± 16,1	0,044
САД, мм рт. ст.	128,2 ± 23,1	126,0 ± 22,0	0,004	128,9 ± 23,2	126,3 ± 22,8	0,079	127,2 ± 21,8	122,3 ± 22,4	< 0,001
ФВЛЖ, %	35,8 ± 13,3	31,7 ± 10,8	< 0,001	35,3 ± 12,5	37,1 ± 15,3	0,092	32,0 ± 10,7	30,8 ± 10,9	0,007
группы ФВЛЖ			< 0,001			0,023			0,031
ФВЛЖ< 40%	64,6	76,8		66,1	59,8		75,8	80,0	
40% ≤ ФВЛЖ< 50%	19,5	16,0		19,7	18,9		17,0	13,1	
ФВЛЖ≥50%	15,9	7,2		14,1	21,2		7,2	6,9	
Класс по NYHA			0,001			< 0,001			< 0,001
I + II, %	44,1	50,8		50,0	27,5		53,8	41,5	

	Все (n = 4684)			Женщины (n = 1251)			Мужчины (n = 3443)		
	Женщины (n = 1251)	Мужчины (n = 3433)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 921)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 330)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 2589)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 844)	P-значение
III + IV, %	55,9	49,2		50,0	72,5		46,2	58,4	
Медикаментозное лечение									
блокаторы РАС, %	87,3	90,0	0,008	88,7	83,3	0,012	90,4	88,7	0,159
доза ингибиторов АПФ/день, % целевой дозы	49,3 ± 40,0	53,2 ± 38,0	0,005	49,3 ± 36,9	49,4 ± 47,8	0,975	52,9 ± 37,7	54,2 ± 39,2	0,452
блокаторы рецептора ангиотензина, %	17,4	15,2	0,060	16,8	19,1	0,353	14,7	16,7	0,144
доза β-блокаторов / день, мг	67,6 ± 62,2	72,6 ± 64,5	0,017	65,6 ± 60,0	73,1 ± 14,5	0,059	70,4 ± 63,7	79–4 ± 66,2	< 0,001
доза петлевых диуретиков / день, мг	86,7	85,1	0,149	44,2 ± 45,6	90,4 ± 83,1	< 0,001	49,2 ± 51,5	86,4 ± 67,9	< 0,001
блокаторы кальциевых	9,2	7,6	0,080	8,6	10,9	0,205	7,7	7,4	0,727

	Все (n = 4684)			Женщины (n = 1251)			Мужчины (n = 3443)		
	Женщины (n = 1251)	Мужчины (n = 3433)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 921)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 330)	P-значение	Уровень МКС квартиль 1–3 (n = 2589)	Уровень МКС квартиль 4 (n = 844)	P-значение
каналов, %									
ацетилсалициловая кислота, %	44,4	48,0	0,027	45,3	41,8	0,278	49,3	44,0	0,007
статинов, %	46,7	57,4	< 0,001	47,7	43,9	0,245	58,2	54,9	0,086
Лабораторные показатели									
рСКФ, мл/мин./1.73 м²	60,3 ± 22,7	66,1 ± 22,3	< 0,001	66,0 ± 21,5	44,6 ± 18,1	< 0,001	70,2 ± 21,1	53,4 ± 21,1	< 0,001
Гемоглобин, г/100 мл	13,31 ± 1,53	14,04 ± 1,74	< 0,001	13,32 ± 1,43	13,21 ± 1,77	0,202	14,09 ± 1,68	13,90 ± 1,90	0,010
Сывороточный калий, ммоль/л	4,32 ± 0,48	4,42 ± 0,46	< 0,001	4,32 ± 0,45	4,32 ± 0,53	0,950	4,41 ± 0,44	4,45 ± 0,51	0,055
Сывороточный натрий, ммоль/л	139,4 ± 3,1	140,0 ± 3,1	< 0,001	139,6 ± 3,5	139,1 ± 3,5	0,047	140,0 ± 3,1	139,9 ± 3,1	0,331
Сывороточный холестерин, ммоль/л	5,08 ± 1,34	4,58 ± 1,22	< 0,001	5,06 ± 1,33	5,11 ± 1,38	0,588	4,59 ± 1,20	4,56 ± 1,28	0,561

Значения представлены в виде средних значений $\pm$ стандартное отклонение или проценты. Доза ингибиторов АПФ/день – процент суточной эквивалентной целевой дозы эналаприла; ARB – блокатор ангиотензиновых рецепторов; доза β -блокатора/день – суточная эквивалентная доза метопролола; рСКФ - расчетная скорость клубочковой фильтрации; СН – сердечная недостаточность; ФВЛЖ - фракция выброса левого желудочка; NYHA – Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация; PCI/CABG – чрескожное коронарное вмешательство и/или шунтирование коронарной артерии; агент-блокатор РАС – блокатор ренин-ангиотензиновой системы; САД - систолическое артериальное давление; МКС – уровень сывороточной мочевой кислоты.