

	Группа без заслепления результатов			Группа с заслеплением результатов				Всего
	ВПЧ отрицательно	ВПЧ положительно	Исследование на ВПЧ не проводилось	Всего	ВПЧ отрицательно	ВПЧ положительно	Исследование на ВПЧ не проводилось	
<b>Результаты исследования на ВПЧ, цитологического и гистологического исследования в цикле 1</b>								
Отрицательный результат цитологического исследования	14367	1675	НП	16042	4787	551	НП	5338
CIN2	1*	22	НП	23	0	0	НП	0
CIN3+	0	10	НП	10	0	0	НП	0
Пограничные результаты цитологического исследования (ASCUS)	923	420	НП	1343	309	137	НП	446
CIN2	16	30	НП	46	3	14	НП	17
CIN3+	2	29	НП	31	2	7	НП	9
цитологические изменения легкой степени (LSIL)	196	447	НП	643	69	166	НП	235
CIN2	2	52	НП	54	1	16	НП	17
CIN3+	1	39	НП	40	0	11	НП	11
Цитологические изменения средней степени тяжести+ (HSIL)	40	318	НП	358	6	99	НП	105
CIN2	5	93	НП	98	1	18	НП	19
CIN3+	4	148	НП	152	0	60	НП	60
Всего в цикле 1	15526	2860	НП	18386	5171	953	НП	6124
CIN2	24	197	НП	221	5	48	НП	53
CIN3+	7	226	НП	233	2	78	НП	80
<b>Результаты исследования на ВПЧ, цитологического и гистологического исследования в цикле 2</b>								
Отрицательный результат цитологического исследования	9334	683	1084	11101	3064	224	368	3656
CIN2	2*	10*	2*	14	0	0	0	0
CIN3+	0*	5*	1*	6	0	1*	0	1
Пограничные результаты цитологического исследования (ASCUS)	189	105	51	345	69	37	29	135
CIN2	3	5	0	8	1	5	0	6
CIN3+	0	6	2	8	1	4	1	6
Цитологические изменения легкой степени (LSIL)	42	107	34	183	6	43	10	59
CIN2	1	11	4	16	0	5	1	6
CIN3+	0	8	0	8	0	3	0	3
Цитологические изменения средней степени тяжести+ (HSIL)	4	37	6	47	1	12	3	16
CIN2	0	10	2	12	0	2	2	4
CIN3+	1	12	0	13	0	8	1	9
Всего в цикле 2	9569	932	1175	11676	3140	316	410	3866
CIN2	6	36	8	50	1	12	3	16
CIN3+	1	31	3	35	1	6	2	19

НП = не применимо. \*Случаи CIN2+, в которых не был получен положительный образец на ВПЧ в цикле 1 (только группа без заслепления результатов) или патологический результат цитологического исследования (оба цикла, обе группы), обозначены \* и исключены из последующих таблиц и схем. В период последующего наблюдения было диагностировано еще 18 случаев CIN2+ по результатам гистологического исследования. В девяти случаях гистологическое исследование было проведено более чем через 30 месяцев после цикла 2 (три CIN2 и четыре CIN3+ в группе без заслепления результатов, два CIN3+ в группе с заслеплением результатов); в восьми случаях мазок цикла 2 не был описан, но гистологическое исследование проводилось до мая 2007 года (четыре CIN2 и один CIN3+ в группе без заслепления результатов, два CIN2 и один CIN3+ в группе с заслеплением результатов); и один результат гистологического исследования, соответствующий CIN2 (группа без заслепления результатов), был определен более чем через 30 месяцев после включения, но до получения мазка в цикле 2.