

Таблица 2. Характеристики участниц, сгруппированных по уровням мочевой кислоты в сыворотке крови

	Квартиль по уровню мочевой кислоты сыворотки				Р-значение для тренда
	1-й (нижний)	2-й	3-й	4-й (верхний)	
Женщины (n = 765)					
Количество участников	204	172	195	194	
Мочевая кислота сыворотки крови (мг/дл)	≤3,8	3,9-4,3	4,4-4,9	≥5,0	
рСКФ (мл/мин/1,73 м²), среднее значение (СО)	98,1 (16,0)	91,0 (14,2)	89,5 (14,1)	84,1 (13,5)	< 0,001
Возраст (лет), среднее значение (СО)	56,3 (9,2)	58,1 (8,6)	57,5 (8,7)	59,7 (7,9)	< 0,001
ИМТ (кг/м²), среднее значение (СО)	20,0 (2,1)	21,0 (2,5)	20,8 (2,6)	22,1 (3,1)	< 0,001
САД, (мм рт. ст.), среднее значение (СО)	109 (15)	113 (16)	114 (17)	117 (18)	< 0,001
ДАД, (мм рт. ст.), среднее значение (СО)	66 (9)	69 (10)	69 (11)	72 (11)	< 0,001
НbA1c (%), среднее значение (СО)	5,6 (0,6)	5,5 (0,4)	5,5 (0,3)	5,6 (0,4)	0,865
ЛПВП-ХС (мг/дл), среднее значение (СО)	72 (15)	72 (15)	71 (15)	71 (17)	0,279

	Квартиль по уровню мочевой кислоты сыворотки				Р-значение для тренда
	1-й (нижний)	2-й	3-й	4-й (верхний)	
ЛПНП-ХС (мг/дл), среднее значение (СО)	129 (27)	136 (29)	133 (30)	139 (28)	0,005
ТГ (мг/дл), медиана (МКР)	63 (49, 89)	70 (58, 105)	68 (64, 120)	82 (74, 154)	< 0,001
Постменопауза, n (%)	136 (67)	140 (81)	148 (76)	170 (88)	< 0,001
Курит в настоящее время, n (%)	6 (3)	3 (2)	4 (2)	2 (1)	0,213
Злоупотребляет алкоголем в настоящее время, n (%)	62 (30)	58 (34)	85 (44)	75 (39)	0,023
Потребление алкоголя в настоящее время, этанол (г/сут) ^а , медиана (МКР)	5 (3, 13)	7 (2, 14)	7 (3, 13)	11 (3,4, 17)	0,559
Расчетное потребление соли, г/сут (СО)	8,2 (1,8)	8,5 (1,8)	8,1 (1,7)	8,2 (1,9)	0,655

рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации, *ИМТ* – индекс массы тела, *САД* – систолическое артериальное давление, *ДАД* – диастолическое артериальное давление, *ЛПВП-ХС* – холестерин липопротеинов высокой плотности, *ЛПНП-ХС* – холестерин липопротеинов низкой плотности, *ТГ* – триглицериды, *МКР* – межквартильный размах. ^аВ настоящее время только злоупотребляет алкоголем.