

Таблица 2. Наличие респираторных вирусов у пациентов с пневмонией и затруднением дыхания

	Респираторные симптомы ( <i>n</i> = 382)		Значение <i>P</i>	Пневмония ( <i>n</i> = 112)		Значение <i>P</i>
	Пациенты с пневмонией ( <i>n</i> = 112)	Пациенты без пневмонии ( <i>n</i> = 270)		Пациенты с затруднением дыхания ( <i>n</i> = 57)	Пациенты без затруднения дыхания ( <i>n</i> = 55)	
Риновирус	12 (11%)	23 (8,5%)	0,5	8 (15%)	4 (7,0%)	0,2
Вирус гриппа	7 (6,3%)	28 (10,4%)	0,2	2 (3,6%)	5 (8,8%)	0,4
Вирус парагриппа	5 (4,5%)	23 (8,5%)	0,2	2 (3,6%)	3 (5,3%)	1,0
Коронавирус	7 (6,3%)	17 (6,3%)	1,0	4 (7,3%)	3 (5,3%)	0,7
Респираторно-синцитиальный вирус	3 (2,7%)	19 (7,0%)	0,1	3 (5,5%)	0 (0%)	0,1
Метапневмовирус человека	3 (2,7%)	5 (1,9%)	0,7	2 (3,6%)	1 (1,8%)	0,6
Аденовирус	1 (0,89%)	1 (0,37%)	0,5	1 (1,8%)	0 (0%)	0,5
Бокавирус	1 (0,89%)	0 (0%)	<i>Нет данных</i>	1 (1,8%)	0 (0%)	0,5

	Респираторные симптомы ( <i>n</i> = 382)		Значение <i>P</i>	Пневмония ( <i>n</i> = 112)		Значение <i>P</i>
	Пациенты с пневмонией ( <i>n</i> = 112)	Пациенты без пневмонии ( <i>n</i> = 270)		Пациенты с затруднением дыхания ( <i>n</i> = 57)	Пациенты без затруднения дыхания ( <i>n</i> = 55)	
1 или более вирусов	34 (30%)	107 (40%)	0,09	18 (33%)	16 (28%)	0,6
2 или более вирусов	7 (6,3%)	13 (4,8%)	0,6	4 (7,3%)	3 (5,3%)	0,7

Были применены критерий хи-квадрат ( $\chi^2$ ) и точный тест Фишера (при размере выборок < 5)

Данные приведены в виде n (%).