

Таблица 3. Количество лейкоцитов и уровень С-реактивного белка для эпизодов с пневмонией и затруднением дыхания

	Респираторные симптомы (382)		Значение <i>P</i>	Пневмония (112)		Значение <i>P</i>
	Пациенты с пневмонией (n = 112)	Пациенты без пневмонии (n = 270)		Пациенты с затруднением дыхания (n = 57)	Пациенты без затруднения дыхания (n = 55)	
БКК	13,8 (sd 14)	11,1 (sd 9,3)	0,07	12,4 (sd 5,7)	15,1 (sd 19)	0,3
БКК >10	57 (51%)	111 (42%)	0,08	27 (47%)	30 (56%)	0,4
БКК >15	29 (26%)	38 (14%)	0,006	14 (26%)	15 (26%)	1,0
СРБ	146 (sd 92)	105 (sd 79)	< 0,0001	158 (sd 95)	134 (sd 88)	0,2
СРБ >80	81 (72%)	151 (56%)	0,003	43 (78%)	38 (67%)	0,2
CRP >100	71 (63%)	120 (44%)	0,0007	38 (69%)	33 (58%)	0,2

Данные приведены в виде средних значений (стандартное отклонение) или n (%).

Были применены двухвыборочный t-критерий Стьюдента и критерий хи-квадрат (χ^2).

Значимые величины выделены полужирным шрифтом и курсивом.

БКК – лейкоциты ($\times 10^9/\text{л}$), СРБ – С-реактивный белок (мг/л).