

	Известный результат ВПЧ		Скрытый результат ВПЧ		Группа результатов без группой	без в с	заслепления сравнении с заслеплением
	N	Распространенность (95% ДИ)	N	Распространенность (95% ДИ)			
<b>Цикл 1: все женщины</b>							
Количество рандомизированных женщин	18386		6124				
CIN2	220	1,20% (1,04-1,36)	53	0,87% (0,65-1,13)	1,39 (1,03-1,88)	0,035	
CIN3+	233	1,27% (1,11-1,44)	80	1,31% (1,04-1,62)	0,97 (0,75-1,25)	>0,2	
CIN2+	453	2,46% (2,24-2,70)	133	2,17% (1,82-2,57)	1,14 (0,94-1,38)	>0,2	
<b>Цикл 2: все женщины</b>							
Количество женщин	11676		3866				
CIN2	36	0,31% (0,22-0,43)	16	0,41% (0,24-0,67)	0,74 (0,41-1,34)	>0,2	
CIN3+	29	0,25% (0,17-0,36)	18	0,47% (0,28-0,73)	0,53 (0,30-0,96)	0,042	
CIN2+	65	0,56% (0,43-0,71)	34	0,88% (0,61-1,23)	0,63 (0,42-0,96)	0,035	
<b>Цикл 1 плюс цикл 2: все женщины</b>							
CIN2	256	1,50% (1,32-1,70)	69	1,28% (0,99-1,62)	1,18 (0,90-1,55)	>0,2	
CIN3+	262	1,51% (1,33-1,71)	98	1,77% (1,43-2,16)	0,85 (0,67-1,08)	>0,2	
CIN2+	518	3,01% (2,75-3,28)	167	3,03% (2,59-3,53)	0,99 (0,83-1,19)	>0,2	
<b>Цикл 1: женщины с отрицательными результатами цитологического исследования и положительным результатом исследования на ВПЧ на момент включения в цикл 1</b>							
Количество женщин	1675		551				
CIN2	22	1,31% (0,82-1,98)	0	НП	НП	НП	
CIN3+	10	0,60% (0,29-1,10)	0	НП	НП	НП	
CIN2+	32	1,91% (1,31-2,69)	0	НП	НП	НП	
<b>Цикл 2: женщины с отрицательными результатами цитологического исследования и положительным результатом исследования на ВПЧ на момент включения в цикл 1</b>							
Количество женщин	988		326				
CIN2	13	1,32% (0,70-2,24)	7	2,15% (0,87-4,37)	0,61 (0,24-1,54)	>0,2	
CIN3+	15	1,52% (0,85-2,49)	7	2,15% (0,87-4,37)	0,70 (0,28-1,74)	>0,2	
CIN2+	28	2,83% (1,89-4,07)	14	4,29% (2,37-7,10)	0,65 (0,34-1,25)	>0,2	
<b>Цикл 1 плюс цикл 2: женщины с отрицательными результатами цитологического исследования и положительным результатом исследования на ВПЧ на момент включения в цикл 1</b>							
CIN2	35	2,61% (1,81-3,65)	7	2,15% (0,87-4,37)	1,22 (0,54-2,79)	>0,2	
CIN3+	25	2,11% (1,35-3,12)	7	2,15% (0,87-4,37)	0,98 (0,42-2,30)	>0,2	
CIN2+	60	4,69% (3,56-6,05)	14	4,29% (2,37-7,10)	1,10 (0,60-2,00)	>0,2	

НП = не применимо. Цикл 2 был определен как первое адекватное цитологическое исследование, проведенное через 26-54 месяца после включения. Отклонение результатов цитологического исследования в цикле 2 на дату гистологического исследования, было признано для двух случаев CIN3, диагностированных через 29 и 35 месяцев после включения. Три случая CIN3 в цикле 2 с CIN2 в цикле 1 были исключены. Один случай CIN2 (группа без заслепления результатов) был исключен из цикла 1 по причине отрицательного результата цитологического исследования. 14 случаев CIN2, 4 случая CIN3 и два случая рака (группа без заслепления результатов), а также еще CIN3 из группы с заслеплением результатов были исключены из цикла 2 по причине отрицательного результата цитологического исследования в цикле 2 (см. Таблицу 2).