

Таблица 4. Результаты распределения в подгруппы, анализа чувствительности и предварительного запланированного анализа в подгруппах

	ПСА		Объем предстательной железы		Оценка по шкале МШПС		Максимальная объёмная скорость потока мочи	
	СРС (95% ДИ)	p-значение	СРС (95% ДИ)	p-значение	СРС (95% ДИ)	p-значение	СРС (95% ДИ)	p-значение
Возраст								
<65 лет	-0,08 (0,24 – 0,08)	0,31	-0,08 (-1,43 – 1,27)	0,91	0,32 (-0,59 – 1,23)	0,49	-	-
>65 лет	0,23 (0,06-0,39)	0,007	1,39 (-1,15 – 3,93)	0,28	0,14 (-0,54 – 0,83)	0,68	0,34 (-1,61 – 2,28)	0,73
Уровень тестостерона								
Пониженный	0,15 (0,01-0,29)	0,03	0,76 (-1,21 – 2,73)	0,45	0,31 (-0,28 – 0,9)	0,30	0,34 (-1,61 – 2,28)	0,73
Нормальный	-0,10 (-0,30 – 0,10)	0,32	-0,05 (-1,55 – 1,44)	0,94	-0,41 (-1,84 – 1,03)	0,58	-	-
Методы определения тестостерона								
Общепринятый стандартный метод*	-0,05 (-0,25 – 0,15)	0,64	0,26 (-1,74 – 2,26)	0,80	0,34 (-0,59 – 1,27)	0,47	-	-
Не общепринятый метод*	0,13 (-0,01 – 0,27)	0,08	0,23 (-1,26 – 1,72)	0,76	0,14 (-0,54 – 0,81)	0,69	0,90 (-1,13 – 2,92)	0,38
Качество исследования (уровень А)**								
Краткосрочная	0,30 (0,07-0,54)	0,01	0,40 (-2,61 – 3,41)	0,79	0,02 (-1,01 – 1,04)	0,98	-	-
Долгосрочные	-0,04 (-0,18 – 0,10)	0,57	-0,00 (-1,39 – 1,39)	1	0,28 (-0,39 – 0,95)	0,41	-0,60 (-3,04 – 1,84)	0,63
Содержание ПСА в сыворотке								
ПСА > 2 нг/мл	0,41 (-0,36 – 1,18)	0,29	0,00 (-12,55 – 12,55)	1	-1,50 (-4,30 – 1,30)	0,29	-	-
ПСА – 1-2 нг/мл	0,06 (-0,07 – 0,20)	0,38	-0,11 (-1,52 – 1,29)	0,87	0,44 (-0,19 – 1,07)	0,17	0,36 (-1,79 – 2,52)	0,74
ПСА < 1 нг/мл	0,14 (-0,11 – 0,39)	0,28	1,2 (-1,09 – 3,49)	0,31	-0,34 (-1,90 – 1,23)	0,67	1,99 (-1,64 – 5,62)	0,28
Продолжительность АЗТ								
Краткосрочная	0,30 (0,09-0,50)	0,005	0,93 (-1,41 – 3,27)	0,43	-0,03 (-1,00 – 0,95)	0,96	1,99 (-1,64 – 5,62)	0,28
Долгосрочные	-0,04 (-0,17 – 0,10)	0,62	-0,00 (-1,39 – 1,39)	1,00	0,31 (-0,35 – 0,98)	0,35	0,36 (-1,79 – 2,52)	0,74

АЗТ = андроген-заместительная терапия; ДИ = доверительный интервал; МШПС = Международная шкала простатических симптомов; ПСА = простатический специфический антиген; СРС = стандартизированная разность средних.

* Общепринятым стандартным методом была tandemная масс-спектрометрия и жидкостная хроматография.

** Уровень А: все критерии качества выполнены (адекватно), низкий риск смещения.