

Таблица 1. Исходные характеристики

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
Возраст, лет	66 (58–73)	64 (56–71)	70 (65–76)	< 0,0001
Женщины, %	32,8%	33,4%	30,4%	Незначимо
Курят в настоящее время, %	16,1%	17,2%	12,2%	Незначимо
Предшествующий инфаркт миокарда, %	22,2%	20,9%	27,0%	Незначимо
Предшествующая реваскуляризация, %	20,9%	19,9%	24,3%	Незначимо
Сахарный диабет, %	22,0%	23,3%	17,4%	Незначимо

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
Фракция выброса левого желудочка, %*	64 (53–71)	65 (58–72)	53 (39–67)	< 0,0001
Систолическая дисфункция левого желудочка, %	19,0%	13,0%	40,0%	< 0,0001
Индекс массы тела, кг/м ²	28 (25–31)	28 (26–31)	27 (25–31)	Незначимо
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.	140 (129– 156)	139 (129– 153)	145 (131– 161)	0,019
Диастолическое артериальное	79 (72–86)	79 (73–86)	77 (69–85)	Незначимо

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
давление, мм рт. ст.				
Центральное аугментационное давление, мм рт. ст. [†]	16 (9–23)	15 (9–22)	20 (10–27)	0,003
≥ 24 мм рт. ст.	23,5%	18,7%	40,7%	0,0002
Центральное пульсовое давление, мм рт. ст. [†]	50 (39–63)	49 (39–61)	56 (42–73)	0,001
50 мм рт. ст.	52,1%	49,1%	62,8%	0,13
Общий холестерин, ммоль/л	4,5 (3,8– 5,2)	4,5 (3,9–5,4)	4,1 (3,5– 4,7)	< 0,0001

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
Холестерин липопротеинов высокой плотности, ммоль/л	1,2 (1,0– 1,4)	1,2 (1,0–1,4)	1,2 (1,0–1,5)	Незначимо
Расчетная скорость клубочковой фильтрации, мл/мин	82 (68–97)	85 (69–98)	78 (60–93)	0,002
Низкочастотная вариабельность сердечного ритма, мс ² ‡	211 (72– 470)	213 (85–446)	191 (27– 1017)	Незначимо
> 250 мс ²	56,5%	57,4%	52,7%	Незначимо

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
Общая мощность вариабельности сердечного ритма, мс ^{2‡}	830 (323– 1954)	766 (360– 1764)	1101 (198– 3150)	Незначимо
Высокочувствительный С-реактивный белок, мг/л□	1,9 (0,9– 4,0)	1,9 (0,8–3,9)	2,1 (1,0– 4,5)	Незначимо
> 3 мг/л	32,4%	31,9%	34,2%	Незначимо
Натрийуретический пептид типа В, пг/мл	40 (15–90)	27 (12–53)	188 (137– 413)	–
> 100 пг/мл	22,0%			

Характеристика	Всего <i>N</i> = 522	МНП ≤ 100 пг/мл <i>N</i> = 407	МНП > 100 пг/мл <i>N</i> = 115	<i>p</i> - значение
	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	Среднее значение (МКР) или %	
> 400 пг/мл	5,6%			
10-летний риск по Фрамингемской шкале, %	11 (8–20)	11 (7–20)	13 (8–20)	Незначимо
10-летний риск по шкале SCORE, %	9 (4–17)	8 (3–16)	12 (7–22)	< 0,0001

Незначимо — применяется при множественных сравнениях.

*На основании выборки пациентов с результатами эхокардиографии перед проведением ангиографии (*n* = 1295).

[†]*n* = 8 отсутствуют.

[†]Участники со стабильным сигналом ЭКГ в течение пяти минут (*n* = 464).

□ *n* = 1 отсутствует.