

Таблица 2. Мгновенное воздействие ОТД на клинические характеристики здоровых субъектов

Исследование	Частота сердечных сокращений	Давление крови	Температура кожи (°C)
Luguet et al., 1970 (кол-во = 40) [45]	До воздействия ОТД: 89 После воздействия ОТД: 97	До воздействия ОТД: 116/67 После воздействия ОТД: 120/72	Не изучалось
Harke and Bleichert, 1972 (кол-во = 10) [46]	До воздействия ОТД: 72 ± 8 После воздействия ОТД: 74 ± 12	До воздействия ОТД: 123/84 После воздействия ОТД: 121/84	До воздействия ОТД: 0,0 градусов После воздействия ОТД: 0,0273 градусов
Rummel et al., 1975 (кол-во = 56) [47]	До воздействия ОТД: 72 ± 10 После воздействия ОТД: 71 ± 11	До воздействия ОТД: 117/71 После воздействия ОТД: 117/71	Не изучалось
Hurshman et al., 1978 (кол-во = 8) [48]	До воздействия ОТД: 73 После воздействия ОТД: 79	До воздействия ОТД: 107/67 После воздействия ОТД: 114/68	Не изучалось
Pimm et al., 1978 (кол-во = 20) [49]	До воздействия ОТД: 84 (Ж), 77 (М) После воздействия ОТД: 80 (Ж), 80 (М)	Не изучалось	Не изучалось