ООО «ИНВИТРО», 125047, г. Москва,
ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3, 3 этаж, помещение I, комната 3.
+7 (800) 200 363 0, +7 (495) 363 0 363, www.invitro.ru

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения __ __ / __ __ / __ __ (число / месяц / год) Пол м ж Номер полиса Номер ДК

Тел./моб.: sms: Штрих-код:

e-mail: Кодовое слово:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

ФИО врача

☐ **Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала.**

☐ **Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутствии.**

☐ **С данными бланка ознакомлен(а), претензий не имею.**

Подпись/расшифровка

__ __ / __ __ / __ __ (число / месяц / год)

Комплекс тестов «ГАСТРОПАНЕЛЬ»

Комплекс тестов (разработка финской компании BIOHIT), позволяющих выявить наличие Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита, определить локализацию патологического процесса в желудке и оценить характер изменений. Программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) позволяет предоставить наиболее вероятную интерпретацию результатов, предполагаемый диагноз, расчет рисков и рекомендации.

Заполняется пациентом (нужное подчеркнуть)

Эрадикация H. pylori – стандартное лечение, направленное на полное уничтожение H. pylori с использованием антибиотиков и др.):

☐ > 1 года назад ☐ < 1 года назад ☐ не было ☐ неизвестно

Использование препаратов ИПП (ингибиторы протонной помпы, например, лансопразол, омепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол и др.):

☐ часто ☐ иногда ☐ нет ☐ неизвестно

Симптомы повышенной кислотности (кислый привкус во рту, отрыжка, изжога, несварение желудка):

☐ часто ☐ нет ☐ неизвестно

Использование НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, ибупрофен, диклофенак, индометацин и др.)

☐ часто ☐ нет ☐ неизвестно

ГАСТР	**Гастропанель** антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиноген I, пепсиноген II, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный (натощак)	343 г ● 343 г ●
978	**Стимуляционная проба*** гастрин-17 стимулированный * (после приема белкового завтрака)	344 г ● 344 г ●

Специальные обозначения:

343 – номер контейнера г ● – пробирка с сиреневой крышкой с гелем – центрифугировать 10 мин. 2000g

– перелить в сухую чистую пробирку – заморозить (-17...-23°C) в вертикальном положении

* Стимуляционная проба позволяет дифференцировать пациентов с атрофическим гастритом антрального отдела от пациентов с низким базальным уровнем гастрина-17 (<1 пмоль/л натощак), связанным с высокой кислотностью.

Аллергических реакций на сою, молочные продукты, яйца, шоколад не наблюдалось (эти компоненты могут входить в состав белкового напитка, применяющегося для стимуляционной пробы).

Настоящим подтверждаю, что с правилами преаналитики перед проведением теста ознакомлен(а), мне разъяснено, что несоблюдение указанных правил может повлиять на результаты исследования.

ФИО _____ / _____ (подпись) дата «_____» _____ 20____ г.