

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 08.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 08.10.2025 11:54
Врач: 08.10.2025 16:24
Дата печати результата: 08.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Антитела к Компонентам комплекса калиевого канала, класса IgG			
АТ к LGI1 в ликворе	не обнар	титр	не обнар
АТ к CASPR2 в ликворе	не обнар	титр	не обнар
Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики			

Комментарии к заявке:
Локализация: Ликвор

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Дата рождения:	27.06.1980
Возраст:	45 лет
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	08.10.2025 07:00
Дата поступления образца:	08.10.2025 11:54
Врач:	08.10.2025 16:24
Дата печати результата:	08.10.2025

Исследование

Комментарий к результату исследования

Отрицательный результат выявления антител к LG1 в значительной степени исключает наличие таких диагнозов, как лимбический энцефалит, эпилепсия, нейромиотония или синдром Морвана. У некоторых пациентов с иммуносупрессией на фоне тяжелой соматической патологии или медикаментозной терапией отрицательный результат теста может наблюдаться при наличии лимбического энцефалита. Антитела к LG1 направлены против белковых молекул, связанных с вольтаж-зависимыми калиевыми каналами (VGKC). Отрицательный результат исследования ликвора на антитела к LG1 значительно снижает клиническую вероятность наличия аутоиммунного энцефалита. Отрицательный результат выявления антител к CASPR2 в значительной степени исключает наличие таких диагнозов, как лимбический энцефалит, эпилепсия, нейромиотония или синдром Морвана. У некоторых пациентов с иммуносупрессией на фоне тяжелой соматической патологии или медикаментозной терапией отрицательный результат теста может наблюдаться при наличии лимбического энцефалита. Антитела к CASPR2 направлены против белковых молекул, связанных с вольтаж-зависимыми калиевыми каналами (VGKC). Отрицательный результат исследования ликвора на антитела к CASPR2 значительно снижает клиническую вероятность наличия аутоиммунного энцефалита.

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Локализация: Ликвор

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача