

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения: Д Д М М Г Г Пол: М Ж

СНИЛС:

Дата взятия: Д Д М М Г Г

Время взятия: :

Штрих-код:

Диагноз, принимаемые препараты:

Количество заказанных продуктов:

Комплекс тестов «ГАСТРОПАНЕЛЬ»

Комплекс тестов (разработка финской компании BIOHIT), позволяющих выявить наличие Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита, определить локализацию патологического процесса в желудке и оценить характер изменений. Программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) позволяет предоставить наиболее вероятную интерпретацию результатов, предполагаемый диагноз, расчет рисков и рекомендации.

Заполняется пациентом (нужное подчеркнуть)

Эрадикация H. pylori – стандартное лечение, направленное на полное уничтожение H. pylori с использованием антибиотиков и др.):

- > 1 года назад < 1 года назад не было неизвестно

Использование препаратов ИПП (ингибиторы протонной помпы, например, лансопризол, омепразол, пантопризол, эзомепразол, рабепразол и др.):

- часто иногда нет неизвестно

Симптомы повышенной кислотности (кислый привкус во рту, отрыжка, изжога, несварение желудка):

- часто нет неизвестно

Использование НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, ибупрофен, диклофенак, индометацин и др.)

- часто нет неизвестно

ГАСТР	Гастропанель антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиноген I, пепсиноген II, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный (натошак)	343 г г
ГАСТР978	Гастропанель + Стимуляционная проба* антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 стимулированный, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный (натошак) * (после приема белкового завтрака)	344 г г 343 г г

Специальные обозначения:

343 – номер контейнера г – пробирка с сиреневой крышкой с гелем – центрифугировать 10 мин. 2000g
 – перелить в сухую чистую пробирку – заморозить (-17...-23°C) в вертикальном положении

* Стимуляционная проба позволяет дифференцировать пациентов с атрофическим гастритом антрального отдела от пациентов с низким базальным уровнем гастрин-17 (<1 пмоль/л натошак), связанным с высокой кислотностью.

Аллергических реакций на сою, молочные продукты, яйца, шоколад не наблюдалось (эти компоненты могут входить в состав белкового напитка, применяющегося для стимуляционной пробы).

Настоящим подтверждаю, что с правилами преаналитики перед проведением теста ознакомлен(а), мне разъяснено, что несоблюдение указанных правил может повлиять на результаты исследования.

ФИО _____ / _____

дата « _____ » _____ 20 _____ г.

подпись